

## Coxarthrose : indice algofonctionnel de Lequesne

	Score
<b>1/ Douleur ou gêne</b>	
<b>La nuit</b>	
Non	0 point
Seulement en remuant ou selon la posture	1
Même immobile	2
<b>Lors du dérouillage matinal</b>	
Moins d'une minute	0
De 1 à 15 minutes	1
Plus de 15 minutes	2
<b>Rester debout augmente-il la douleur ?</b>	
Non	0
Oui	1
<b>Lorsque vous marchez</b>	
Non	0
Seulement après une certaine distance	1
Très rapidement, de façon croissante	2
<b>Votre hanche vous gêne-t-elle si vous restez assis longtemps?</b>	
Non	0
Oui	1
<b>2/ Périmètre de marche maximale</b>	
Aucune limitation	0
Limité mais supérieur à 1 km	1
Environ 1 km soit 15 minutes	2
500 à 900 m	3
300 à 500 m	4
100 à 300 m	5
Moins de 100 m	6
<b>3/ Aide</b>	
Rien	0
Une canne ou une béquille nécessaire	1
Deux cannes ou béquilles nécessaires	2
<b>4/Difficultés dans la vie quotidienne</b>	
<b>Mettre ses chaussettes par devant?</b>	
Pas de difficulté	0
Possible avec une petite difficulté	0,5
Possible mais difficilement	1
Possible mais très difficilement	1,5
Impossible	2
<b>Ramasser un objet à terre?</b>	
Pas de difficulté	0
Possible avec une petite difficulté	0,5
Possible mais difficilement	1
Possible mais très difficilement	1,5
Impossible	2
<b>Monter ou descendre un étage?</b>	
Pas de difficulté	0
Possible avec une petite difficulté	0,5
Possible mais difficilement	1
Possible mais très difficilement	1,5
Impossible	2
<b>Sortir d'une voiture ou d'un fauteuil profond?</b>	
Pas de difficulté	0
Possible avec une petite difficulté	0,5
Possible mais difficilement	1
Possible mais très difficilement	1,5
Impossible	2

L'indication chirurgicale est portée à partir de 10 points environ